



Montréal, le 26 juillet 2005

Objet : Puceron du soya et tétranyques à deux points

Mesdames,
Messieurs,

Beaucoup d'attention est porté sur le puceron du soya et certains champs doivent même être traités. Un petit acarien est aussi présent dans le soya et peut causer des dommages considérables : **la tétranyque à deux points**. Ces petits acariens sont très petits et orangés. Ils se retrouvent à l'endos des feuilles et s'alimentent du contenu des cellules végétales. Des petits points apparaissent où les tétranyques se sont nourries et les feuilles peuvent jaunir, s'enrouler et brunir. Aussi, une fine toile peut apparaître à l'endos des feuilles. Les tétranyques envahissent les champs par les bordures et migrent vers le centre.

Le seuil économique pour justifier un traitement des tétranyques est de quatre par feuille jusqu'au stade de remplissage des gousses (R4) et le seul produit homologué est le Cygon.

Si vous traité contre les pucerons du soya, il est très important d'évaluer la présence des tétranyques. Le Matador est le produit privilégié pour le contrôle du puceron. Par contre, celui-ci peut affecter les prédateurs naturels des pucerons et des tétranyques sans toucher à ces dernières, elles pourront donc se développer rapidement.

Dans le cas où vous devriez intervenir contre les pucerons et qu'il y a présence de tétranyques, le Cygon devrait être le produit utilisé. Celui-ci va contrôler les pucerons et les tétranyques (les prédateurs naturels aussi). En utilisant le Cygon, vous ne favoriserez pas le développement des tétranyques.

²
...2

Espérant ces informations à votre convenance, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

François Labrie agr.

François Labrie, agr.
Expert en grandes cultures

FL/jn

Tétranyque.doc